

3

KEY WAYS DADS CAN HELP BABY

Sleep Safe



Dads today spend triple the amount of time caring for their children than dads did 50 years ago.

Making sure dads with infants know how to reduce the risk of **Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)** and other sleep-related causes of infant death is more important than ever.

Dads everywhere can keep baby safe during sleep in the following ways:

1

Always place baby on his or her back to sleep, for naps and at night.

This is the most effective way to reduce the risk of SIDS.

Babies are less likely to choke if placed on their backs to sleep, even if they throw up or drool while sleeping.



2

Share your room with baby.

Keep baby in your room, close to your bed, but on a separate sleep surface designed for infants, ideally for baby's first year, but at least for the first 6 months.

Baby should not sleep in an adult bed, on a couch, or on a chair alone, with you, or with anyone else.



3

Use a firm and flat sleep surface—such as a mattress in a safety-approved crib*—covered by a fitted sheet.

Remove all bumpers, blankets, loose bedding, and soft items from the sleep area.

Do not use car seats, strollers, baby carriers, swings, or other sitting devices as baby's routine sleep area.



Learn how dads and all caregivers can create a safe sleep environment for baby:

<http://safetosleep.nichd.nih.gov>



Sources: Parker, K. and Livingston, G. 6 facts about American fathers. *Pew Research Center*, 2017

Technical Report of the American Academy of Pediatrics Task Force on Sudden Infant Death Syndrome.



Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development



TRES MANERAS CLAVES PARA QUE LOS PAPÁS AYUDEN A QUE SUS BEBÉS

DUERMAN SEGUROS



Hoy en día, los padres pasan tres veces más tiempo cuidando a sus hijos que los padres hace 50 años.


Por ello, es más importante que nunca asegurarse de que los padres de bebés sepan cómo reducir el riesgo del **síndrome de muerte súbita del bebé (SIDS, por sus siglas en inglés)* y otras causas de muerte infantil relacionadas con el sueño.**

Los padres pueden ayudar a que el bebé duerma seguro de las siguientes maneras:

1

Siempre coloque al bebé boca arriba para dormir, durante las siestas y por la noche.


Esta es la forma más efectiva de reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita del bebé. Los bebés tienen menos posibilidades de ahogarse si son puestos boca arriba, aunque vomiten o babeen mientras duermen.



2

Comparta la habitación con el bebé.

Mantenga al bebé en su habitación cerca de su cama, pero en un lugar donde duerma solo y que esté diseñado para bebés, idealmente durante el primer año del bebé, pero al menos durante los primeros 6 meses. El bebé no debe dormir en una cama para adultos, en un sillón o en una silla, ya sea solo o acompañado.



3

Use una superficie firme y plana para dormir, como un colchón en una cuna que cumpla con las normas de seguridad, cubierta con una sábana ajustable.**

No ponga objetos acolchonados, juguetes, protectores para cunas ni cobijas o cobertores de cama sueltos o debajo del bebé, sobre el bebé o en cualquier lugar donde duerme el bebé. No ponga a su bebé a dormir regularmente en un asiento para automóvil, una carriola o silla de paseo, un columpio, un portabebé, un cargador de tela, como un fular o rebozo, ni productos similares.



Aprenda sobre lo que los papás y todos los cuidadores pueden hacer a la hora de dormir para crear un ambiente seguro para los bebés: www.nichd.nih.gov/BebeDormir.

*También se conoce como muerte de cuna o síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

**Se recomienda una cuna, un moisés, una cuna portátil, o un corralito que cumpla con las normas de seguridad de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés). Para obtener información sobre la seguridad de las cunas, póngase en contacto con la CPSC al 1-800-638-2772 (en español o inglés) o ingrese a www.SeguridadConsumidor.gov o www.cpsc.gov.

Fuentes:

Parker, K., and Livingston, G. 6 facts about American fathers. Pew Research Center, 2017.

Informe técnico del grupo de trabajo sobre el síndrome de muerte súbita del bebé de la Academia Americana de Pediatría.



Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development

